

Traumeel® S

GOTAS · COMPRIMIDOS · SOLUCIÓN INYECTABLE · POMADA

Composición

Gotas: 100 g contienen: Arnica D 2, Calendula D 2, Hamamelis D 2, Millefolium D 3 ana 5 g; Belladonna D 4 25 g; Aconitum D 3, Mercurius solubilis Hahnemanni D 8, Hepar sulfuris D 8 ana 10 g; Chamomilla D 3, Symphytum D 8 ana 8 g; Bellis perennis D 2, Echinacea angustifolia D 2, Echinacea purpurea D 2 ana 2 g; Hypericum D 2 1 g.

Contenido en etanol: 35% (vol.).

Comprimidos: 1 comprimido contiene: Arnica D 2, Calendula D 2, Hamamelis D 2, Millefolium D 3 ana 15 mg; Belladonna D 4 75 mg; Aconitum D 3, Mercurius solubilis Hahnemanni D 8, Hepar sulfuris D 8 ana 30 mg; Chamomilla D 3, Symphytum D 8 ana 24 mg; Bellis perennis D 2, Echinacea angustifolia D 2, Echinacea purpurea D 2 ana 6 mg; Hypericum D 2 3 mg. Excipientes: estearato de magnesio, lactosa.

Solución inyectable: 2,2 ml contienen: Arnica D 2, Calendula D 2, Chamomilla D 3, Symphytum D 6, Millefolium D 3, Belladonna D 2 ana 2,2 µl; Aconitum D 2 1,32 µl; Bellis perennis D 2 1,1 µl; Hypericum D 2 0,66 µl; Echinacea angustifolia D 2, Echinacea purpurea D 2 ana 0,55 µl; Hamamelis D 1 0,22 µl; Mercurius solubilis Hahnemanni D 6 1,1 µg; Hepar sulfuris D 6 2,2 µl.

Pomada: 100 g contienen: Arnica D 3 1,5 g; Calendula Ø, Hamamelis Ø ana 0,45 g; Echinacea angustifolia Ø, Echinacea purpurea Ø, Chamomilla Ø ana 0,15 g; Symphytum D 4, Bellis perennis Ø ana 0,1 g; Hypericum D 6, Millefolium Ø ana 0,09 g; Aconitum D 1, Belladonna D 1 ana 0,05 g; Mercurius solubilis Hahnemanni D 6 0,04 g; Hepar sulfuris D 6 0,025 g. Pomada base: excipiente hidrófilo para pomadas compuesto por alcohol cetosteárico, parafina líquida, vaselina filante blanca, agua purificada y etanol. Contenido en etanol: 13,8% (vol.).

Indicaciones

Gotas, comprimidos, solución inyectable: lesiones contusas como esguinces, luxaciones, contusiones, hemartros y derrames articulares. Fracturas. Edema postraumático y posquirúrgico y tumefacción de tejidos blandos. Procesos inflamatorios y procesos degenerativos con inflamación asociada en diversos órganos y tejidos, incluyendo, en particular, los del sistema musculoesquelético (tendosinovitis, estiloiditis, epicondilitis, bursitis, periartrosis escapulohumeral, etc.). Artrosis de cadera, rodilla y pequeñas articulaciones. Convulsión cerebral aguda.

Pomada: lesiones de todo tipo (lesiones deportivas y accidentales), incluyendo lesiones contusas como esguinces, luxaciones, contusiones, hemartros y derrames articulares. Fracturas cerradas, etc. Procesos inflamatorios y procesos degenerativos con inflamación asociada en diversos órganos y tejidos, incluyendo, en particular, los del aparato locomotor (tendosinovitis, bursitis, periartrosis escapulohumeral, etc.). Artrosis de cadera, rodilla y pequeñas articulaciones.

Contraindicaciones

Gotas, comprimidos, solución inyectable: hipersensibilidad a alguno de los principios activos o excipientes, a Arnica, Chamomilla y Achillea millefolium o a otras plantas de la familia de las Compuestas.

En principio, Echinacea no debe utilizarse en caso de enfermedades sistémicas progresivas, como tuberculosis, leucemia o patologías relacionadas con la leucemia, enfermedades inflamatorias del tejido conectivo (colagenosis), enfermedades autoinmunes, esclerosis múltiple, SIDA, infección por VIH y otras enfermedades víricas crónicas.

Pomada: hipersensibilidad a alguno de los principios activos o excipientes o a las plantas de la familia de las Compuestas (árnica).

Reacciones adversas

Gotas, comprimidos: en casos aislados, pueden aparecer reacciones de hipersensibilidad o reacciones alérgicas cutáneas (enrojecimiento, hinchazón y picor) en personas con hipersensibilidad conocida a las plantas de la familia de las Compuestas (por ejemplo, Arnica, Chamomilla y Achillea millefolium). En estos casos, se deberá interrumpir la administración del medicamento. Tras el tratamiento con medicamentos que contienen extractos de Echinacea, se ha observado exantema, prurito y, en raras ocasiones, tumefacción facial, disnea, mareo y una caída de la tensión arterial. Puede aparecer hipersalivación tras la toma, en cuyo caso también debe interrumpirse la administración del medicamento. El principio activo homeopático Mercurius solubilis puede desencadenar ocasionalmente reacciones alérgicas.

Solución inyectable: en casos individuales, es posible que personas con hipersensibilidad conocida a las plantas de la familia de las Compuestas (por ejemplo, Arnica, Chamomilla, Achillea millefolium) presenten reacciones de hipersensibilidad (hasta reacción anafiláctica).

Pueden aparecer en el punto de inyección rubefacción, tumefacción y dolores transitorios. En casos muy poco frecuentes, pueden aparecer reacciones alérgicas cutáneas (enrojecimiento, hinchazón y picor). En este caso se deberá interrumpir la administración del medicamento.

Tras el tratamiento con medicamentos que contienen extractos de Echinacea, se ha observado exantema, prurito y, en raras ocasiones, tumefacción facial, disnea, mareo y una caída de la tensión arterial. Puede aparecer hipersalivación tras la toma, en cuyo caso también debe interrumpirse la administración del medicamento. El principio activo homeopático Mercurius solubilis puede desencadenar ocasionalmente reacciones alérgicas.

Pomada: en casos raros, pueden aparecer reacciones de hipersensibilidad o reacciones alérgicas locales (inflamación cutánea, enrojecimiento, hinchazón y picor). En estos casos, se deberá interrumpir la administración del medicamento.

Interacciones

No se han descrito.

Posología

Gotas: en general, 10 gotas 3 veces al día. En caso de edema de partes blandas, 30 gotas 3 veces al día.

Comprimidos: en general, 1 comprimido 3 veces al día, dejándolo disolver en la boca.

Solución inyectable: en afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en general, 1-2 ampollas 3-1 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. (eventualmente aplicar en forma de pápulas subcutáneas) o i.v., también periarticularmente.

Pomada: 1-2 aplicaciones diarias, por la mañana y por la tarde (o con mayor frecuencia si fuera necesario), sobre las zonas afectadas, efectuando un masaje suave. En caso necesario, puede cubrirse la zona con un vendaje.

Advertencia

Se debe evitar la aplicación prolongada de Traumeel S pomada sobre zonas extensas.

Presentación

Gotas: frascos cuentagotas de 30 y 100 ml.

Comprimidos: envase de 50 comprimidos.

Solución inyectable: cajas de 5 y 50 ampollas de 2,2 ml.

Pomada: tubos de 50 y 100 g.

Observaciones farmacológicas y clínicas

Arnica (árnica)

Estimula la cicatrización de heridas. Fracturas. Luxaciones. Contusiones. Hematomas. Debilidad miocárdica. Neuralgias. Mialgias. Analgésico. Hemostático.

Calendula (caléndula)

Heridas de cicatrización lenta. Favorece la granulación. Analgésico.

Hamamelis (hamamelis)

Estasis venosa. Varices. (Trombo-) flebitis. Úlcera crural. Hemorroides. Hemorragias venosas. Antiinflamatorio. Analgésico.

Millefolium (milenrama)

Hemorragias, especialmente goteantes precapilares arteriovenosas (anastomosis).

Belladonna (belladona)

Fases de reacción localizadas. Sensibilidad cerebral con calambres y delirios.

Aconitum (acónito)

Fiebre con sensación de piel seca y caliente. Neuralgias. Reumatismo inflamatorio. Aumento del tono vascular. Analgésico y hemostático.

Mercurius solubilis Hahnemanni (mezcla que contiene esencialmente mercurioamidonitrato)

Supuraciones. Abscesos. Gingivitis. Estomatitis. Catarro nasofaríngeo. Catarro paranasal. Colangitis. Reducción de estados edematosos.

Hepar sulfuris (hígado de azufre calcáreo)

Tendencia a las supuraciones, especialmente en piel y glándulas linfáticas (forúnculos, piodermitis, panadizos, flemones). Absceso amigdalario. Calacio. Orzuelos. Hemicránea. Trastornos de la micción. Hipersensibilidad al frío y a las corrientes de aire.

Chamomilla (camomila)

Antiinflamatorio. Estimulante de la granulación, favorece la cicatrización de heridas mal curadas y úlceras. Fístulas. Hemorroides. Mastitis. Intertrigo. Estomatitis aftosa. Estados de inquietud y de excitación. Trastornos de la dentición. Otitis media. Tumefacción ganglionar.

Symphytum (consuelda)

Para acelerar la formación del callo óseo en fracturas. Periostitis. Causalgias. Afecciones derivadas de muñones de amputación. Contusiones.

Bellis perennis (chirivita)

Dislocaciones. Contusiones. Sensación de irritación en las paredes y en la cavidad abdominal. Procesos exudativos. Reabsorción de edemas.

Echinacea angustifolia (equinácea de hojas estrechas)

Estímulo de las defensas mesenquimatosas. Procesos inflamatorios de diverso tipo y localización. Procesos sépticos. Inhibidor de la hialuronidasa, efecto antiinflamatorio.

Echinacea purpurea (equinácea purpúrea)

Estímulo de las defensas mesenquimatosas. Procesos inflamatorios de diverso tipo y localización. Procesos sépticos. Inhibidor de la hialuronidasa, efecto antiinflamatorio.

Hypericum (hipérico)

Lesiones nerviosas y cerebrales como, por ejemplo, conmoción cerebral. Dolores neurálgicos tras heridas. Hemostático.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de Traumeel S, se presentan las siguientes posibilidades terapéuticas: lesiones traumáticas, distorsiones y dislocaciones, contusiones, hematomas y hemartros, fracturas, edemas posquirúrgicos y postraumáticos y tumefacción de los tejidos blandos. Procesos inflamatorios y procesos degenerativos con inflamación asociada en diversos órganos y tejidos, incluyendo los que afectan al aparato locomotor y a los tejidos de sostén (tendosinovitis, estiloiditis, epicondilitis, bursitis, periartritis escapulohumeral, artrosis), discopatías y otras enfermedades degenerativas de la columna vertebral, conmoción cerebral (en este último caso, asociado a Vertigoheel).

Otitis media, aguda y crónica (oral, parenteral, incluso instilación local de gotas), sinusitis.

Inflamaciones supurativas como abscesos sudoríparos, forúnculos, ántrax, mastitis puerperal. Parodontosis (parenteral, oral, infiltración local en la mucosa bucal), fistulas supurativas, úlcera crural (pomada, vía oral y/o parenteral).

Eccema, dermatitis atópica, liquen rojo plano, intertrigo.

Estimulación general de las enzimas sulfúricas como, por ejemplo, en iatrogenia y fases degenerativas.

En el tratamiento del postinfarto de miocardio (regulación del nivel de protrombina).

El mecanismo de acción de Traumeel S se debe al efecto sinérgico y complementario (Bürgi) de sus componentes vegetales y quimicominales, que se caracterizan por las siguientes propiedades:

1. Acción antivírica y antiinflamatoria de los mercuriales.
2. Aumento del tono vascular (Aconitum, Arnica) y efecto impermeabilizante vascular (acción del calcio). Eliminación de la estasis venosa y efecto antitrombótico (Hamamelis) y hemostático (Millefolium) y, además, normalización del nivel de protrombina.
3. Apoyo y aumento de la respiración celular y de los procesos de oxidación mediante el sulfuro y el polisulfuro cálcicos (Hepar sulfuris).
4. Estimulación del Sistema de la Gran Defensa.
5. Estimulación de la cicatrización de heridas mediante agentes fitoterápicos (Arnica, Calendula, Echinacea, Symphytum). Formación de pus bonum et laudabile.
6. Efecto analgésico (Aconitum, Arnica, Chamomilla, Hamamelis, Hypericum).
7. Efecto hemostático (Aconitum, Arnica, Hamamelis –venoso–, Hypericum, Millefolium –arterial–, sulfuro y polisulfuro cálcicos de acción impermeabilizante vascular).

Efectos principales de Traumeel S

1. Regenerativo

Artrosis, fracturas, epicondilitis (codo de tenista), estiloiditis radial, tendosinovitis.

2. Antiexudativo

Tumefacción de partes blandas traumática y posquirúrgica, conmoción cerebral, artrosis (con o sin derrames irritativos), derrames intraarticulares espontáneos, traumáticos y posquirúrgicos; hematomas intraarticulares (hemartros traumático), hematomas de partes blandas, tendosinovitis, bursitis prepatelar, otitis media.

3. Antiinflamatorio:

Bursitis prepatelar, epicondilitis (codo de tenista), estiloiditis radial, tendosinovitis, otitis media.

La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cuadro clínico o de la fase patológica.