

Spascupreel® / Spascupreel® S

Spascupreel®

COMPRIMIDOS • SOLUCIÓN INYECTABLE

Spascupreel® S

SUPOSITORIOS

Composición

Comprimidos: 1 comprimido contiene: Colocynthis D 4, Ammonium bromatum D 4, Atropinum sulfuricum D 6, Veratrum D 6, Magnesium phosphoricum D 6, Gelsemium D 6 ana 30 mg; Passiflora incarnata D 2, Agaricus D 4, Chamomilla D 3, Cuprum sulfuricum D 6 ana 15 mg; Aconitum D 6 60 mg. Excipientes: estearato de magnesio, lactosa.

Solución inyectable: 1,1 ml contiene: Colocynthis D 4, Ammonium bromatum D 4, Atropinum sulfuricum D 6, Veratrum D 6, Magnesium phosphoricum D 6, Gelsemium D 6 ana 1,1 µl; Passiflora incarnata D 2, Agaricus D 4, Chamomilla D 3, Cuprum sulfuricum D 6 ana 0,55 µl; Aconitum D 6 2,2 µl.

Supositorios: 1 supositorio contiene: Colocynthis D 3, Ammonium bromatum D 3, Atropinum sulfuricum D 5, Veratrum D 5, Magnesium phosphoricum D 6, Gelsemium D 5 ana 1,1 mg; Passiflora incarnata D 1, Chamomilla D 2, Cuprum sulfuricum D 5, Agaricus D 3 ana 0,55 mg; Aconitum D 5 2,2 mg.

Indicaciones

Espasmos en órganos huecos de musculatura lisa (estómago, intestino, vesícula biliar, útero y vías urinarias), síndrome del intestino irritable y dismenorrea. Espasmos en la musculatura estriada (miogelosis, endurecimiento muscular).

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a Chamomilla o a otras plantas de la familia de las Compuestas. Primer trimestre del embarazo.

Reacciones adversas

En casos raros pueden presentarse reacciones alérgicas cutáneas.

Interacciones

No se han descrito.

Posología

Comprimidos: en general, 1 comprimido 3 veces al día, dejándolo disolver en la boca. En afecciones agudas, varias veces 1 comprimido cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo).

Solución inyectable: en afecciones agudas, 1 ampolla varias veces al día; en general, 1 ampolla 3-1 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.

Supositorios: en general, 1 supositorio 2-3 veces al día. En afecciones agudas, varias veces 1 supositorio cada hora, hasta que aparezca la mejoría. En lactantes menores de 6 meses, la dosis es de 1/2 supositorio cada vez.

Presentación

Comprimidos: envase de 50 comprimidos.

Solución inyectable: cajas de 5 y 50 ampollas de 1,1 ml.

Supositorios: envases de 12 supositorios de 2,0 g.

Observaciones farmacológicas y clínicas

Colocynthis (coloquintida)

Dolores punzantes repentinos, tanto en movimiento como en reposo. Cólicos (el paciente se dobla de dolor, lo que proporciona una mejoría, lo mismo que el calor y la presión fuerte). Sensación de adormecimiento después de los dolores. Ciática.

Ammonium bromatum (bromuro amónico)

Tos irritativa. Bronquitis espasmódica y asmática.

Atropinum sulfuricum (sulfato de atropina)

Neuralgias. Migrañas. Tos ferina. Cólicos renales y biliares. Espasmos de la musculatura lisa.

Veratrum (vedegambre)

Tendencia al colapso y estados de colapso con piel cianótica o pálida y fría, así como con sudor frío. Calambres en la pantorrilla.

Magnesium phosphoricum (fosfato magnésico)

Diátesis espasmódica. Neuralgias. Trastornos de la dentición (niños). Dismenorrea.

Gelsemium (jazmín)

Vértigo. Aturdimiento. Cefalea occipital con sensación de tener una venda alrededor de la cabeza. Dolores en los globos oculares. Angustia cardíaca. Migraña. Neuralgia del trigémino. Dismenorrea.

Passiflora incarnata (pasionaria)

Insomnio nervioso. Estados de inquietud.

Agaricus (agárico)

Estados de excitación. Inquietud motora. Tics. Sensibilidad al aire frío.

Chamomilla (camomila)

Hipersensibilidad con aturdimiento (los niños quieren ser tenidos en brazos). Neuralgias. Tos seca y con cosquilleo. Trastornos de la dentición. Cólico umbilical. Inquietud y excitación. Insomnio.

Cuprum sulfuricum (sulfato de cobre)

Espasmos de la musculatura lisa y estriada como, por ejemplo, en tos ferina. Asma bronquial. Gastroenteritis aguda. Epilepsia.

Aconitum (acónito)

Angina de pecho con ansiedad y sensación de muerte inminente. Reumatismo inflamatorio.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de Spascupreel, se presentan las siguientes posibilidades terapéuticas: tratamiento de dolores de mayor o menor consideración en la región abdominal, originados por estados espasmódicos como, por ejemplo, cólico biliar, colecistopatías, espasmos acompañantes en úlcera gástrica y duodenal, colitis espasmódica, cólico renal, tenesmo vesical y dismenorrea. Diferentes formas de asma bronquial y de bronquitis espasmódica, además de estados espasmódicos laríngeos, incluso, por ejemplo, en laringitis estridulosa y tos ferina.

Espasmos en lactantes durante la dentición. Cólicos biliares.

Angiospasmos, migraña. Endurecimiento muscular (mialgias, miogelosis) de cualquier origen como, por ejemplo, espasmos musculares de tipo reflejo en osteocondrosis.

Siempre se recomienda la administración simultánea (en caso necesario, en forma de inyección mixta) de los medicamentos específicos del órgano afectado, como: Chelidonium-Homaccord N, Injeel-Chol y Hepeel N en cólico biliar, Reneel y Berberis-Homaccord en cólico renal, y Tónico-Injeel, Engystol N, Galium-Heel N e Ignatia-Homaccord en asma bronquial.

La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cuadro clínico o de la fase patológica.