

CICADERMA

Dermatología

¿QUÉ ES CICADERMA Y PARA QUÉ SE UTILIZA?

CICADERMA es un medicamento homeopático que actúa como protector cutáneo, utilizado tradicionalmente para el alivio de la irritación de la piel: pequeñas heridas y cortes superficiales, quemaduras leves, picaduras de insectos, eritemas y rasguños.



Si quiere saber más, haga clic aquí

ANTES DE USAR CICADERMA

Si usted es alérgico a las sustancias activas o a cualquier otro componente del preparado, no debe utilizar este medicamento. No aplicar en lesiones infectadas y supurantes. Si usted está embarazada o en período de lactancia, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar un medicamento. CICADERMA contiene Hypericum, por lo que debe evitarse la exposición al sol de las zonas impregnadas con la pomada, por el riesgo de fotosensibilización.

“Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica”

¿CÓMO USAR CICADERMA?

Aplicar la pomada de 1 a 3 veces al día en capa fina sobre la piel irritada, después de limpiar la zona afectada. Uso cutáneo.

“Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas” “Recuerde utilizar su medicamento”.

Si estima que la acción de CICADERMA es demasiado fuerte o débil, comuníquese a su médico o a su farmacéutico. Si los síntomas empeoran o persisten durante más de una semana, consulte a su médico. Si usted ha utilizado CICADERMA más de lo que debe, consulte inmediatamente a su médico o a su farmacéutico. Si olvidó utilizar CICADERMA: No utilice una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Forma farmacéutica

CICADERMA se presenta en tubo de pomada de 40g.

¿Qué contiene? Las sustancias activas son: Vaselina por digestión de Caléndula officinalis, Hypericum perforatum, Achillea millefolium (2/1/1 : 10) 97 g. Ledum palustre TM 1,5 g para 100 g de pomada. Los otros componentes son: Vaselina, etanol 60% V/V.

Posibles efectos adversos

Como todos los medicamentos, CICADERMA puede tener efectos adversos. Si se observa cualquier reacción no descrita en este prospecto, consulte con su médico o con su farmacéutico.

Conservación

No conservar a temperatura superior a 30°C. No utilizar CICADERMA después de la fecha de caducidad indicada en la caja. Mantenga CICADERMA fuera del alcance y de la vista de los niños.

