

OSCILLOCOCCINUM

Sistema respiratorio

¿QUÉ ES OSCILLOCOCCINUM Y PARA QUÉ SE UTILIZA?

Medicamento homeopático utilizado tradicionalmente tanto en el tratamiento sintomático de los estados gripales como durante el periodo de exposición gripal.



Si quiere saber más, haga clic aquí

ANTES DE TOMAR OSCILLOCOCCINUM

Si usted está embarazada o en período de lactancia, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento. Este medicamento contiene sacarosa y lactosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

"Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento - incluso los adquiridos sin receta médica".

¿CÓMO TOMAR OSCILLOCOCCINUM?

Para extraer el envase unidosis: Coger una barqueta de 3 envases unidosis. Empujar un envase unidosis desde el lado transparente hasta romper el precinto. Sacar el envase unidosis. El contenido completo de un envase unidosis corresponde a una toma. La posología varía según el momento en el que se interviene:

- Durante el periodo de exposición gripal: Tomar un envase unidosis a la semana.
- Al inicio del estado gripal: Tomar un envase unidosis lo antes posible en cuanto aparezcan los primeros síntomas. Si es necesario, repetir la toma cada 6 horas, 2 ó 3 veces.
- En un estado gripal declarado: Tomar un envase unidosis por la mañana y otro por la noche durante 3 días. Vaciar directamente el contenido entero de un envase unidosis bajo la lengua manteniéndolo hasta su disolución.

Si los síntomas empeoran o persisten durante más de tres días, debe consultar a un médico. OSCILLOCOCCINUM se absorbe por vía sublingual. *"Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas."* *"Recuerde tomar su medicamento."* Si estima que la acción de OSCILLOCOCCINUM es demasiado fuerte o débil, comuníquese a su médico o farmacéutico. Si usted ha tomado OSCILLOCOCCINUM más de lo que debe, consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico. Si olvidó tomar OSCILLOCOCCINUM no tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Forma farmacéutica

OSCILLOCOCCINUM se presenta en envase unidosis de 1 gramo de glóbulos en caja de 6 o de 30 unidades

¿Qué contiene?

La sustancia activa en cada envase unidosis de 1 gramo de glóbulos es: Anas barbariæ 200 K - 0,01 ml Los demás componentes por cada envase unidosis de 1 gramo son sacarosa (0,85 gramos) y lactosa (0,15 gramos).

Posibles efectos adversos

Como todos los medicamentos, OSCILLOCOCCINUM puede tener efectos adversos. Si se observa cualquier reacción no descrita en este prospecto, consulte con su médico o farmacéutico.

Conservación

No se precisan condiciones especiales de conservación. Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase unidosis. Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el punto SIGRE de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente. Mantenga OSCILLOCOCCINUM fuera del alcance y de la vista de los niños.

